



接種的疫苗原始劑量：強生 (J&J)

所有接種過強生(J&J)單劑疫苗的個人都應該接種加強劑疫苗。其中包括免疫系統中度或嚴重削弱的個人。加強劑可以是任意一種COVID-19疫苗（強生、輝瑞或莫德納）。如果你對加強劑的風險和益處或者需要接種何種疫苗作為加強劑有疑問，請諮詢你的醫生。



接種的疫苗原始劑量：輝瑞或莫德納

加強劑疫苗適用於接種過輝瑞或莫德納兩劑系列疫苗的原始劑量且符合特定條件的個人。加強劑可以是任意一種COVID-19疫苗（強生、輝瑞或莫德納）。如果你對加強劑的風險和益處有疑問，或者不確定你是否適合接種加強劑，或者應該接種哪種疫苗作為加強劑，請諮詢你的醫生。

滿足以下任一條件的個人**應該**接種加強劑：

- ✓ 年齡為65歲及以上的個人
- ✓ 年齡在18歲及以上，且住在長期護理機構內
- ✓ 年齡在50-64歲之間，且身患**基礎疾病**的個人

滿足以下任一條件的個人**可以**接種加強劑：

- 年齡在18-49歲之間，且身患**基礎疾病**的個人
- 年齡在18-64歲之間，且由於職業或所處機構環境而有較高的接觸COVID-19病毒風險的個人

免疫系統中度或嚴重削弱的個人可在接種完額外劑量（第三劑）疫苗的6個月後接種加強劑。請參見「免疫功能受損者適合接種的疫苗劑量」。

輝瑞



莫德納

